

Ζητάσιος κίνδυνος θρόμβωσης στο σκληρόδεμα

Arthritis Care & Research

Δεδομένα από την περιοχή του British Columbia, Canada με 1245 ασθενείς με σκληρόδεμα όπου:

- Η επίπτωση για πνευμονική εμβολή (PE), εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT), και φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (VTE) ήταν 3.47, 3.48, και 6.56 / 1000 person-years. Τα ευρήματα για 12.670 άτομα χωρίς σκληρόδεμα ήταν 0.78, 0.76, και 1.37 / 1000 person-years
- Ο κίνδυνος (HRs) μεταξύ ασθενών με SCL για PE, DVT και VTE ήταν 3.73 (95% CI, 1.98-7.04), 2.96 (95% CI, 1.54-5.69), και 3.47 (95% CI, 2.14-5.64)
- Ο παραπάνω κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος τον 1^ο χρόνο μετά την διάγνωση



The risk of pulmonary embolism and deep venous thrombosis in systemic sclerosis: A general population-based study. Sara R. Schoenfeld, Hyon K. Choi, Eric C. Sayre and J. Antonio Aviña-Zubieta
Arthritis Care & Research. Accepted manuscript online: 20 JUL 2015 01:11PM EST | DOI: 10.1002/acr.22673

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη