

Αντιφωσφολιπιδικά Ab σε νέους με ΑΕΕ (συστ. ανασκόπηση)


Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

Συστηματική ανασκόπηση σε PUBMED με **5217** ασθενείς (< 50 ετών) και υγιείς μάρτυρες από 43 μελέτες :

Η συνολική συχνότητα των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (aPL) ήταν :

- **17,4% (5%-56%) για κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (CVE)**, και πιο ειδικά
 - 17.2% (2%-56%) για ΑΕΕ και
 - 11.7% (2%-45%) για παροδικό ισχαιμικό
- Η παρουσία aPL αύξανε τον κίνδυνο για ΑΕΕ κατά **5 φορές** (5.48-fold (95% CI 4.42 - 6.79))

Σημειώνεται ότι προβλήματα επαναληψιμότητας της μεθόδου μέτρησης και ορίων φυσιολογικών τιμών είναι υπεύθυνα για σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς στην διαγνωστικό έλεγχο των aPL



The estimated frequency of antiphospholipid antibodies in young adults with cerebrovascular events: a systematic review. Sciascia S1, Sanna G2, Khamashta MA3, Cuadrado MJ2, Erkan D4, Andreoli L5, Bertolaccini ML6; APS Action. Ann Rheum Dis. 2015 Nov;74(11):2028-33. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205663. Epub 2014 Jun 18.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη