



## Επιτυχής διακοπή TNFi σε σοβαρή νόσο Behçet

41% των ασθενών με σοβαρής μορφής νόσο Behçet, ανθεκτική σε συμβατικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, που έλαβαν αντι-TNF-α αγωγή για 2 χρόνια και ανταποκρίθηκαν, είναι σε **θέση**

**να διακόψουν την αντι-TNF-α** αγωγή χωρίς υποτροπή νόσου για τα επόμενα 3 τουλάχιστον χρόνια.

Το υπόλοιπο ποσοστό των ασθενών που θα διακόψει anti-TNF-α αγωγή, θα υποτροπιάσει 1 χρόνο περίπου μετά την διακοπή της αγωγής, με την επαναχορήγηση αυτής να είναι επιτυχής στο 82% αυτών

Τα ευρήματα προέρχονται από αναδρομική εκτίμηση μιας σειράς 87 συνολικά ασθενών ενός κέντρου, 29 εκ των οποίων, αφού ανταποκρίθηκαν σε TNFi, διέκοψαν την αγωγή.

Είναι ερώτημα αν η παρατεταμένη αυτή ύφεση είναι αποτέλεσμα της θεραπείας ή μέρος της φυσικής πορείας της νόσου.

*Drug-Free Long-Term Remission in Severe Behçet's Disease Following Withdrawal of Successful Anti-Tumor Necrosis Factor Treatment. Sfrikakis PP, Arida A1, Panopoulos S, Fragiadaki K, Pentazos G, Laskari K, Tektonidou M, Markomichelakis N.. Arthritis Rheumatol. First published: 8 November 2017. doi: 10.1002/art.40235.*

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.

Arthritis & Rheumatology  
AN OFFICIAL JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY  
AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY  
Explore this journal >

Brief Report

**Brief Report: Drug-Free Long-Term Remission in Severe Behçet's Disease Following Withdrawal of Successful Anti-Tumor Necrosis Factor Treatment**

Petros P. Sfrikakis MD, Aikaterini Arida MD, Stylianos Panopoulos MD, Kalliopi Fragiadaki MD, George Pentazos MD, Katerina Laskari MD, Maria Tektonidou MD, Nikos Markomichelakis MD