



Η ΡΑ στην Ελλάδα



Mediterr J Rheumatol 2018; 29(1): 27-37

Multicenter Cross-sectional Study of Patients with Rheumatoid Arthritis in Greece: Results from a cohort of 2.491 patients

Πολυκεντρική (cross-sectional) μελέτη με **2.491 ασθενείς με ΡΑ από την Ελλάδα** (οι περισσότεροι από 3 βαθμια νοσοκομεία, 79% γυναίκες, μέσης ηλικίας 63 ετών και μέσης διάρκειας νόσου 9,9 έτη, 52% οροθετικοί για RF ή/και αντι-CCP) :

- 82% υπό θεραπεία με συμβατικά συνθετικά DMARDs
- 42% υπό βιολογική θεραπεία (TNFi: 22%, non-TNFi: 20%)
- 40% υπό κορτικοστεροειδή (μέση δόση 5,2 mg)
- 36% είχε μέτρια και 12% υψηλή ενεργότητα νόσου
- πιο συχνές συνοσηρότητες: ΑΥ (42%), δυσλιπιδαιμία (33%), οστεοπόρωση (29%), ΣΔ (15%), κατάθλιψη (12%)
- λανθάνουσα ΤΒ λοίμωξη (θετική *tuberculin skin test* ή *interferon gamma release assay*) στο 13% και 15.3% αντίστοιχα
- 6.2% είχε ιστορικό έρπητα ζωστήρα, 2% και 0.7% ιστορικό χρόνιας ηπατίτιδας Β ή C
- πιστοποιημένο ιστορικό σοβαρής λοίμωξης στο 9.6%
- για τον πνευμονιόκοκκο και τη γρίπη, μόνο το 36% και 52% αντίστοιχα είχε εμβολιασθεί στο παρελθόν

Multicenter Cross-sectional Study of Patients with Rheumatoid Arthritis in Greece: Results from a cohort of 2.491 patients. Konstantinos Thomas, Argiro Lazarini, et al Mediterr J Rheumatol 2018; 29(1): 27-37

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

[Η 'ΕΠΙΒΙΩΣΗ' ΤΩΝ TNFI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ SPA](#)

[ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ \(8/17\)](#)

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **μιας μόνο εργασίας** και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.