



Κάπνισμα & ανάπτυξη ΡΑ

EDITOR'S CHOICE

Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis ^{FREE}

Raphaële Seror, Julien Henry, Gaele Gusto, Henri-Jean Aubin, Marie-Christine Boutron-Ruault ✉, Xavier Mariette

Rheumatology, Volume 58, Issue 7, July 2019, Pages 1154–1162,

Σύμφωνα και με το γαλλικό αρχείο E3N cohort (98.995 εθελόντριες), επιβεβαιώνεται ότι το **ενεργό κάπνισμα σχετίζεται με την ανάπτυξη**

ΡΑ, φαίνεται όπως για **πρώτη φορά** ότι η παθητική έκθεση σε καπνό κατά την παιδική ηλικία πιθανώς να αυξάνει τον κίνδυνο για μελλοντική ανάπτυξη ΡΑ, τόσο ήπιους καπνιστές όσο και σε μη καπνιστές.

Πιο συγκεκριμένα :

- Καπνιστές, χωρίς παθητική έκθεση, είχαν αυξημένο κίνδυνο για ΡΑ (*HR 1.38 (95% CI 1.10, 1.74)*)
- Στους μη-καπνιστές, η έκθεση κατά την παιδική ηλικία σε καπνό σχετίστηκε με οριακή αύξηση του κινδύνου για ΡΑ, **παρόμοια με αυτή των ενήλικων ενεργών καπνιστών** (*HR 1.43 (95% CI 0.97, 2.11)*)

Raphaële Seror, Julien Henry, Gaele Gusto, Henri-Jean Aubin, Marie-Christine Boutron-Ruault, Xavier Mariette, *Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis,*

Rheumatology, Volume 58, Issue 7, July 2019, Pages 1154–1162

[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

Το άρθρο μας έστειλε ο κος Χ. Παπαγόρας και τον ευχαριστούμε για αυτό

Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη. Αποτελεί επίσης εύρημα **ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ** εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης. Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περιλήψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.