

Παρανεοπλασματικά σύνδρομα στην Ρευματολογία (ανασκόπηση)

Σε ασθενείς με συμπτώματα από το μυοσκελετικό προέχει η επιβεβαίωση ή ο αποκλεισμός της παρουσίας ενός ρευματολογικού νοσήματος, σημασία έχει όμως και το γεγονός ότι κάποιος όγκος θα μπορούσε να πυροδοτήσει παρόμοια μυοσκελετικά προβλήματα.

Η διάγνωση μιας παρανεοπλασματικής ρευματικής νόσου απαιτεί προσεκτική κλινική διερεύνηση σε συνδυασμό με γνώση των μυοσκελετικών συνδρόμων που σχετίζονται με νεοπλασματικές καταστάσεις.

Συχνά παρανεοπλασματικά ρευματικά νοσήματα είναι η **υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, παρανεοπλασματική πολυαρθρίτιδα, RS3PE, πελματιαία περιτοναϊτίδα με πολυαρθρίτιδα, μυοσίτιδα σχετιζόμενη με καρκίνο και οστεομαλακία επαγόμενη από καρκίνο.**

Είναι σημαντική η ευθύνη του ρευματολόγου να διαγνώσει κάποια τέτοια κακοήθεια και στη συνέχεια να παραπέμψει σωστά τον ασθενή

Είναι εντυπωσιακή η δράση των όγκων στο μυοσκελετικό, με βλάβες σε ιστούς όπως το περιόστεο, η υμενική μεμβράνη, το υποδόριο, περιτονίες, μύες και οστό

Μερικοί από τους μηχανισμούς δράσεις έχουν πλέον γίνει γνωστοί, με πιο σημαντικούς τους ρόλους των vascular endothelial growth factor και fibroblast growth factor 23



Paraneoplastic syndromes in rheumatology. Manger B, Schett G. Nat Rev Rheumatol. 2014 Nov;10(11):662-670. doi: 10.1038/nrrheum.2014.138. Epub 2014 Aug 19.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη