
Σχετίζονται τα ΜΣΑΦ με την πρόκληση κολπικής μαρμαρυγής?



Δεδομένα παρακολούθησης 8.423 ασθενών χωρίς AF από την Rotterdam Study, με μέση παρακολούθηση 13 χρόνια

- 857 άτομα ανέπτυξαν κολπική μαρμαρυγή (AF)
- Η **τρέχουσα** λήψη ΜΣΑΦ σχετίστηκε με **αυξημένο κίνδυνο για AF** σε σχέση με άτομα που δεν έλαβαν ποτέ τέτοια φάρμακα (HR 1.76, 95% CI 1.07 - 2.88)
- **Πρόσφατη** χρήση ΜΣΑΦ (*διακοπή ΜΣΑΦ 1 μήνα πριν την εμφάνιση AF*) σχετίστηκε επίσης με AF σε σχέση με άτομα που δεν έλαβαν ποτέ (HR 1.84, 95% CI 1.34 - 2.51) μετά από προσαρμογή για ηλικία, φύλο και άλλους παράγοντες

Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of atrial fibrillation: a population-based follow-up study.
Krijthe BP1, Heeringa J, Hofman A, Franco OH, Stricker BH. *BMJ Open.* **2014 Apr** *8*;4(4):e004059. doi:
10.1136/bmjopen-2013-004059.

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη