

---

---

## Anti-P στον ΣΕΛ (συστ. ανασκόπηση & μετανάλυση)

---

---



Στη ανασκόπηση περιελήφθησαν 16 μελέτες (cohort studies με 2355 ασθενείς). Η παρουσία του Anti-ribosomal P (anti-P) αντισώματος :

- Σχετίστηκε με **εξάνθημα** στα ζυγωματικά (malar rash), με στοματικά **έλκη** και **φωτοευαισθησία** (OR (95% CI) : 2.05 (1.42-2.92), 1.49 (1.05-2.13) , 1.44 (1.08-1.91))
- Δεν σχετίστηκε με αρθρίτιδα η νεφρική προσβολή
- Νευροψυχιατρικός λύκος, ηπατική προσβολή, anti-dsDNA, anti-Sm και anti-cardiolipin αντισώματα ανεβρέθησαν πιο συχνά σε ασθενείς με anti-P, παρά σε αυτούς χωρίς (πιθανή συσχέτιση)

*The association of serum anti-ribosomal P antibody with clinical and serological disorders in systemic lupus erythematosus: a systematic review and meta-analysis. Shi ZR1, Cao CX, Tan GZ, Wang L. Lupus. 2014 Nov 17. pii: 0961203314560003. [Epub ahead of print]*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη