

Λέμφωμα στο Σ Sjögren's

Το Σύνδρομο Sjögren's (SS) είναι μια χρόνια, αυτοάνοση διαταραχή, με προσβολή κυρίως της λειτουργίας των εξωκρινών αδένων και με καλά τεκμηριωμένη τη σχέση του με το λέμφωμα. Στο άρθρο αυτό, από την Ιατρική σχολή του Παν/μιου της Αθήνας, έγινε μια συστηματική ανασκόπηση σε άρθρα στο MEDLINE και PubMed (1968 – 2012) σχετικά με το SS και την κακοήθη αυτή λεμφο-υπερπλαστική διεργασία

- Η πιο συχνή λεμφική νεοπλασία στο SS είναι το χαμηλού βαθμού, οριακής ζώνης λέμφωμα MALT (mucosa-associated lymphoid tissue)
- Τα περισσότερα SS –λεμφώματα χαρακτηρίζονται από εντοπισμένο στάδιο, βραδεία κλινική πορεία και επανεμφάνιση σε άλλα εξω-οζιδιακά σημεία
- Αν και η μετάπτωση από το στάδιο της χρόνιας φλεγμονώδους κατάστασης σε κακοήθες λέμφωμα είναι μια πολύ-επίπεδη διαδικασία και όχι πλήρως κατανοητή, υπάρχουν σήμερα αυξημένα ευρήματα ότι ο χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός από ένα εξω-αντιγόνο ή αυτοαντιγόνα, παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της λεμφο-υπερπλαστικής αυτής διεργασίας στο SS

*Malignant lymphoma in primary Sjögren's syndrome: An update on the pathogenesis and treatment. Routsias JG, Goules JD, Charalampakis G, Tzima S, Papageorgiou A, Voulgarelis M. **Semin Arthritis Rheum.** 2013 Jun 28. pii: S0049-0172(13)00059-0. doi: 10.1016/j.semarthrit.2013.04.004. [Epub ahead of print]*