

## Συνοσηρότητα στην ΡΑ

Δεδομένα από 4586 ασθενείς, εκ των οποίων 3920 αναλύθηκαν τελικά (39% υπό έκθεση σε βιολογικό παράγοντα), από 17 χώρες:

- τα πιο συχνά σχετιζόμενα νοσήματα (στο παρόν ή το παρελθόν) ήταν : **κατάθλιψη 15%**, άσθμα 6,6%, καρδιαγγειακά συμβάματα 6%, κακοήθεια συμπαγών οργάνων (εκτός βασικοκυτταρικού καρκινώματος) 4,5 %, ΧΑΠ 3,5%
- Διαπιστώθηκε υψηλού βαθμού διαφοροποίηση για την μεταξύ των διαφόρων κρατών συχνότητα των συνοσηροτήτων αλλά και τον αριθμό των ασθενών που πειθαρχούσε στις κατά τόπους οδηγίες
- Διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα σε ελέγχους ζωτικών σημείων πχ αυξημένη **ΑΠ στο 11,2 %**, όπως και διαπιστώθηκαν καταστάσεις που εκδηλώνονται με εργαστηριακά ευρήματα όπως **υπεργλυκαιμία στο 3,3%** και **υπερλιπιδαιμία στο 8,3%**

*Prevalence of comorbidities in rheumatoid arthritis and evaluation of their monitoring: results of an international, cross-sectional study (COMORA). Dougados M, Soubrier M, Antunez A, Balint P, Balsa A, Buch MH, Casado G, Detert J, El-Zorkany B, Emery P, Hajjaj-Hassouni N, Harigai M, Luo SF, Kurucz R, Maciel G, Mola EM, Montecucco CM, McInnes I, Radner H, Smolen JS, Song YW, Vonkeman HE, Winthrop K, Kay J. **Ann Rheum Dis. 2013 Oct 16.** doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204223. [Epub ahead of print]*

### Σχετικά άρθρα στο EREnews:

- [Λιπίδια & απόκριση στην στατίνη στην ΡΑ](#)
- [Επηρεάζει η κατάθλιψη την ενεργότητα της ΡΑ ?](#)

Το ενημερωτικό κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο.  
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης