
Εξέλιξη Δερματικού Λύκου σε Συστηματικό



Προοπτική μελέτη σε 77 ασθενείς με Δερματικό Ερυθηματώδη Λύκο (CLE)

- 13 ασθενείς (**17%**) εξελίχθησαν σε ΣΕΛ , με πλήρωση κριτηρίων, 8,03 χρόνια μετά την διάγνωση CLE
- Από τους 13 αυτούς ασθενείς, μόνο ένας πληρούσε τα βλεννοδερματικά ACR κριτήρια (πεταλούδα, δισκοειδές, φωτοευαισθησία και στοματικά έλκη) και 3 τα βλεννοδερματικά κριτήρια σε συνδυασμό με ANA και άλλους τίτλους αντισωμάτων
- Μετά από παρακολούθηση 2,8 ετών, μόνο 5 από τους 13 ασθενείς που εξελίχθησαν σε ΣΕΛ ανέπτυξαν μέτρια – σοβαρή επιπρόσθετη συστηματική νόσο

Φαίνεται ότι ένα **μικρό ποσοστό ασθενών με CLE θα αναπτύξει τελικά ΣΕΛ**, αλλά ακόμη και αν αυτό γίνει , **οι περισσότεροι ασθενείς θα έχουν ήπια** συστηματική μορφή

Systemic Symptoms in the Progression of Cutaneous to Systemic Lupus Erythematosus. Wiczorek IT1, Probert KJ2, Okawa J1, Werth VP1. JAMA Dermatol. 2014 Jan 29. doi: 10.1001/jamadermatol.2013.9026. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη