

---

---

## Ότι λάμπει...δεν είναι χρυσός (και στην ΡΑ ύφεση)

---

---

### RHEUMATOLOGY

29 ασθενείς με ΡΑ, αφού πέτυχαν κλινική ύφεση (SDAI 3.3, χωρίς ευαισθησία ή οίδημα σε καμία από τις 68 και 66 αντίστοιχα αρθρώσεις ) για τουλάχιστον 6 μήνες, υποβλήθηκαν σε υπέρηχο μυοσκελετικού

- Το ποσοστό των ασθενών με Power Doppler (PD) υμενίτιδα 1<sup>ου</sup> βαθμού ήταν 58.6%; **PD 2<sup>ου</sup> βαθμού 31.0%** και PD 3<sup>ου</sup> βαθμού 6.9%
- Η παρουσία **οστικών διαβρώσεων με US ήταν υψηλή τόσο ανά ασθενή (P < 0.05) όσο και ανά άρθρωση (P < 0.0001) στις περιπτώσεις με PD** σήμα θετικό σε σχέση με περιπτώσεις με αρνητικό σήμα

Φαίνεται ότι ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ PD υμενίτιδα υπάρχει σε ασθενείς με ύφεση, συμβαδίζει με κλινικά χαρακτηριστικά και δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί σε διάφορους βιοδείκτες ορού, μεταξύ των οποίων και αγγειογενετικοί παράγοντες

*Ultrasonographic examination of rheumatoid arthritis patients who are free of physical synovitis: power Doppler subclinical synovitis is associated with bone erosion. Kawashiri SY1, Suzuki T, Nakashima Y, Horai Y, Okada A, Iwamoto N, Ichinose K, Tamai M, Arima K, Nakamura H, Origuchi T, Uetani M, Aoyagi K, Eguchi K, Kawakami A. Rheumatology (Oxford). 2014 Mar;53(3):562-9. doi: 10.1093/rheumatology/ket405.*

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης του δημοσιευμένου άρθρου και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη